

FINIGEN[®] SC

INSECTICIDA - Adulticida-Ovicida-Larvicida



IMIDACLOPRID 35,00%

Insecticida altamente concentrado con triple efecto: Adulticida, Ovicida y Larvicida

- ✓ **MARCADO EFECTO DE CHOQUE Y GRAN RESIDUALIDAD A BAJAS DOSIS**
- ✓ **EFICACIA PROLONGADA Y SEGURO PARA UN CONTROL EFICAZ DE INSECTOS**
- ✓ **NO MANCHA, NO IRRITA, NO SE VOLATILIZA, NO HUELE Y ES SEGURO PARA SU USO EN SALUD PÚBLICA**



FINIGEN® SC

INSECTICIDA - Adulticida-Ovicida-Larvicida



FORMATOS

60 ml, 250ml,
1L, 5L, 20 L, 200 L, 1000 L



Ácaro



Mosquito



Garrapata



Cucaracha



Piojo



Mosca



Escarabajo



Pulga



Termita

PLAGA



PARA INSECTOS EN GENERAL:

- Aspersión
- Pulverización
- Nebulización



PARA TERMITAS:

- Aplicación por inyección al suelo
- Aspersión

APLICACIÓN

COMPOSICIÓN

Imidacloprid 35,00%

PROPIEDADES

- Insecticida superconcentrado no mancha, no irrita, no huele y no se volatiliza.
- Amplio espectro de acción para el control de insectos rastreros, arácnidos, insectos voladores y termitas.
- El IAT Imidacloprid actúa tanto sobre individuos adultos como huevos y larvas primarias, lo que permite prolongar su efecto en el tiempo, frenando su ciclo biológico mediante la inhibición del desarrollo adulto, eclosión de los huevos y muerte de los primeros estadios de larvas, impidiendo completar su ciclo reproductivo.
- Actúa por contacto e ingestión sobre numerosas especies consideradas plaga en salud pública.
- Sin riesgo para operadores profesionales, para público en general ni para el medioambiente.

DOSIS

Diluir 2-4 ml en 1 L de agua para tratar 10 m²

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre las superficies donde los insectos se desplazan, posan y/o habitan, poniendo especial atención en lugares de anidamiento y puesta de huevos, en muros, perímetros de hogares o lotes y lugares de acumulación de materia orgánica.

ESPECTRO DE ACCIÓN

Insectos Rastreros

Cucarachas (*Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*, *Blatella germanica*)
Gorgojo de la cama (*Alphitobius diaperinus*)
Hormiga de fuego (*Solenopsis xyloni*)
Hormiga faraón (*Monomorium pharaonis*)
Hormiga negra de jardín (*Lasius niger*)
Zompopas (*gen. Atta* y *gen. Acromymex*)
Pulgas (*gen. Ceratophyllidae*, *gen. Leptopsyllidae* y *gen. Pulicidae*)
Picudo rojo (*Rhynchophorus ferrugineus*)
Chinches (*Cimex lectularius*)
Hormiga loca (*Nylanderia fulva*)

Termitas

Coptotermes spp.
Nasutitermes spp.
Reticulitermes spp.
Cryptotermes spp.

Insectos voladores

Moscas (*Musca domestica*, *Stomoxys calcitrans*, *Haematobia irritans*)
Tábanos (*Tabanus* spp.)
Mosquitos y Zancudos (*gen. Aedes*, *gen. Culex*, *gen. Ochlerotatus*, *gen. Anopheles*)
Avispas (*Vespula* spp.)

Arácnidos

Garrapatas (*Ixodes ricinus*)
Ácaros (*Dermatophagoides pteronyssinus*, *Dermanyssus gallinae*)
Alacranes (*Centruroides* spp.)

REGISTRO

Nº de registro único MS: P-20-00012